

# 埔里榮民醫院

## 鼻胃管灌食 (印尼文版)



u14431432 fotosearch.com

# 鼻胃管灌食 (印尼文版)

## Letak alat pencernaan



Dari hidung sampai usus. (放在胃内)

## Tujuan pengimpuan (目的)



## Persiapan peralatan pengimpuan



Makanan, jarum, pengimpuan, air handuk, handuk, plester, kapas, nampan.

(食物、灌食空針、溫開水、衛生紙或毛巾、膠布、棉棒、盛物盤)

## 1 Langkah Pertama Pengimpuan (灌食前)



1. Penjelasan  
(Apa Yang Akan Dikerjakan).  
(向病人解釋)



2. Cuci Tangan.  
(洗手)



3. Tegakkan Kepala 45 Derajat.  
(半坐臥)

4. Tutup Badan Dengan Handuk/selimut.  
(鋪上毛巾)

5. Mengecek Keadaan Pasien: pencernaan, warna, memastikan apakah alat pengimpuan terpasang dengan baik. (反抽觀察)  
● Dimasukkan kembali (胃液推回)



6. beri Air Hangat 30cc Pemasukan alat pengimpuan.  
(灌溫水30cc潤滑管路)



7. Mempersiapkan Makan:  
● Susu Sekitar 250~300cc.  
● Suhu Badan Sekitar 37-40.  
● Air Hangat.  
● Makanan Kaleng.  
(準備食物: 量250-300cc · 溫水 · 灌食器)

埔里榮民醫院社區健康中心關心您的健康!



## 2

### Langkah Kedua Pengimpuasan

(灌食中)



1. Pengimpuasan Pernapasan.

(反折胃管接灌食器防止空氣進入)



2. Pengimpuasan makanan mencapai ketinggian 35-40cm.

(灌食高度35-40cm)



3. Waktu pengimpuasan 10-30menit.

(速度10-30分, 緩慢流入)



4. Mengecek keadaan pasien misalnya:

Batuk, Keakitan, Ber-Keringat, Muntah, Lalu segera menormalkan pengimpuasan.

(觀察病人反應, 如有持續咳嗽、發汗、嘔吐馬上停止灌食並觀察其變化)

## 3

### Langkah Terakhir Pengimpuasan

(灌食後)



1. Air hangat 30cc untuk mencuci alat pengimpuasan.

(溫水30cc將管子洗淨)



2. Menutup alat pengimpuasan.

(反折胃管末端)

3. Ketetapan pengimpuasan penutupan kembali alat pengimpuasan.

(蓋好蓋子及固定管子)



4. Tetapmenjagah keadaan pengimpuasan selama 30menit.

(姿勢維持不變30分鐘)



5. Mencuci semua peralatan Pengimpuasan.

(清洗用物晾乾)

6. Cuci tangan.

(洗手)

Jangan salah melakukan pengimpuasan





## Perawatan pernapasan yang (照顧的注意事項) perlu diperhatikan



### 1. perawatan pengimpusan.

pengimpusan sebanyak 100cc  
,memerlukan waktu selama 30  
~60menit.

(灌食前反抽胃液觀察如大於  
100cc需延後30分再看吸收  
狀況)



### 2. pengimpusan dahak sela -ma 30 menit.

Setelah pengimpusan tidak  
boleh langsung meludah  
(dalam waktu 30 menit).

(灌食前30分先去除肺、口鼻腔  
分泌物，灌食後30分內不可抽  
痰)



### 3. setiap hari merawat kebe -rsihan pernapasan.

(每天清潔口鼻腔)



### 4. setiap hari mengganti plester.

(每天更換膠布固定在50-55cm  
或第2-第3刻度)

### 5. setiap hari pengimpusan sebanyak 5-6kali.

(灌食次數5-6次)

### 6. pengimpusan tidak boleh melebihi 500cc.

(一次灌食量不超過500cc)

### 7. suhu badan tidak boleh mencapai 37-40c.

(食物溫度約37-40度)

### 8. harus mengetahui, keadaan pengimpusan apakah normal.

(知道如何沖泡牛奶及製作食物)

### 9. pengimpusan tidak boleh melebihi 30menit.

(食物置於室溫勿超過30分)

## Menjagah pengimpusan pernapasan

(預防管子阻塞)



- Pengimpusan memerlukan air hangat sebanyak 30-50cc.
- Susu dan cairan pengimpusan tidak boleh bersamaan, obat-orattan dijadikan bubuk.
- Buah-buahan dan makanan memerlukan penyaringan, susu harus encer, kalau kental menyumbat pernapasan.

(灌食前後要灌溫水，藥跟牛奶需分開灌並均勻，製作果汁及食物要過濾)

## Pencegahan kelalaiyan pengimpusan

(預防管子脫落)



Turun dari tempat tidur, mandi,  
plester, jangan mengenai perna  
-pasan, perhatikan plester jang  
-an sampai lepas/terbuka.

(下床、洗澡、換膠布不要扯到  
管子及適當固定)

## Pencegahan pasien dalam pengimpusan



(預防拔管)



Pasien dalam melakukan gerakan harus menjagah  
keadaan plester/sarung tangan.

(病人意識混亂躁動不安要穿戴保護性手套)

## pencegahan yang harus diperhatikan

(異常狀況處理)



- Pasien yang melepaskan alat pengimpusan harus melalui persetujuan dokter.
- Hasil pengimpusan menunjuk-an warna kopi, merah, berak juga warna hitam dan pencernaan mengeluarkan darah.

(管子脫落，反抽胃液出現咖啡色或紅色  
及解黑便需告知護理師及送醫處理)