

臺中榮民總醫院埔里分院
電腦斷層掃描檢查預約單

姓名：_____

病歷號碼：_____

檢查當日
請攜帶健保IC卡

預約檢查時間：

請於民國____年____月____日^{上午}/_{下午}____時____分至本院放射線科
登記候檢。(不必掛號)

檢查前準備：(以打√為準)

無飲食限制。

檢查前六小時禁吃食物與飲水(早上檢查者自午夜起禁食，
下午檢查者早餐後禁食)。

注意事項：

- 1.請詳閱檢查說明，並填好檢查同意書，報到時交回。
- 2.每位病人病情不同，所需檢查時間亦不同，報到時如前面病人尚未完成檢查，請稍候依序就檢。
- 3.如果因事無法如期受檢，請來電(049)2990833轉3800與放射線科聯絡，重新安排檢查時間。
- 4.請個人自行妥善保管檢查同意書單張，以避免資料外洩。

臺中榮民總醫院埔里分院 電腦斷層掃描檢查及對比劑使用說明書

電腦斷層掃描乃利用電腦計算X光射線通過人體後的資訊組成影像，以瞭解身體的構造並據以診斷疾病。檢查時依病況需要，多數需注射對比劑以協助判讀。

一、檢查方式

1. 大多數電腦斷層檢查必要時需注射對比劑可以獲得更佳顯影效果，增加診斷準確性。
2. 可以不注射對比劑來進行電腦斷層檢查，但在絕大多數狀況下，這種檢查方式將使診斷價值與診斷的準確性大幅降低。
3. 如需以其他的檢查方式來代替電腦斷層，請與您的臨床醫師討論。

二、檢查的風險和機率

電腦斷層掃描檢查其風險來源有三：

1. 輻射線造成的風險：醫療檢查輻射線所造成的危害機率甚微，較易受輻射影響的族群包括生育年齡女性、兒科病患、胎兒等，請與醫師溝通相關可能危險與檢查帶來的幫助。女性病患若可能已懷孕，請務必於檢查前告知檢查室工作人員。
2. 靜脈注射對比劑造成的風險：①大多數電腦斷層掃描檢查需借助靜脈注射對比劑以協助診斷，使用對比劑檢查時，在部分體質特異者，較容易發生急性不良反應，其中以輕微過敏反應（如：起疹子、發癢、噁心）較常見，且症狀大多在一天內皆能消失，少數病患可能產生較嚴重過敏症狀，如：低血壓、呼吸困難、心臟衰竭等，有極少數病患可能因此導致死亡。請詳閱對比劑使用同意書，以評估自身是否為使用對比劑之高危險群，並告知檢查室工作人員。②靜脈注射對比劑，因希望能獲取更佳顯影效果，對比劑會以加壓（注射器）方式注射，而部分病患因靜脈血管較細微或血管壁脆弱，在注射過程中因血管壁破裂，造成對比劑滲漏而產生局部靜脈炎或局部組織壞死。
3. 檢查過程中突發病況或病情惡化的風險：在病房及檢查室往返以及檢查過程中，少數嚴重疾病病患有突發病況惡化之可能，我們會盡全力予以協助。

三、注射對比劑後注意事項

1. 注射對比劑可能引發急性不良反應，因此檢查完成後，請務必於候檢區休息並於注射處加壓至少10~15分鐘，確認無不良反應發生時才離開醫院，以確保安全，並請多喝開水，以利對比劑排出。
2. 病患返家後，如有上述不良反應發生，上班時間可以電話 049-2990833 轉 3805 聯絡或返回放射線科，假日或非上班時間請直接至急診室就診。

四、對比劑健保給付說明

電腦斷層檢查所使用之對比劑，於民國 100 年 2 月份起，全面採用非離子性對比劑，並由健保給付對比劑費用。

五、如果您對此次檢查或對比劑使用有任何疑問，請於上班時間打電話向本科醫護人員詢問。

電話：049-2990833 轉 3805 (電腦斷層檢查室)或 3800(放射線科登記櫃檯)