

臺中榮民總醫院埔里分院  
靜脈注射腎盂攝影(IVP)檢查預約單

姓 名：\_\_\_\_\_

病歷號碼：\_\_\_\_\_

預約檢查時間：

**檢查當日**

請攜帶健保IC卡

請於民國\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日<sup>上午</sup><sub>下午</sub>\_\_\_\_時\_\_\_\_分至本院放射線科  
登記候檢。(不必掛號)

檢查前準備：

※檢查前六小時禁吃食物與飲水(早上檢查者自午夜起禁食，  
下午檢查早餐後禁食)。

注意事項：

- 1.請詳閱檢查說明，並填好檢查同意書，報到時交回。
- 2.每位病人病情不同，所需檢查時間亦不同，報到時如前面病人尚未完成檢查，請稍候依序就檢。
- 3.如果因事無法如期受檢，請來電(049)2990833轉3800與放射線科聯絡，重新安排檢查時間。
- 4.請個人自行妥善保管檢查同意書單張，以避免資料外洩。

# 臺中榮民總醫院埔里分院

## 靜脈注射腎盂攝影(IVP)檢查及對比劑使用說明書

### 一、檢查方式及注意事項：

由靜脈注射含碘對比劑，再經由 X 光來進行影像檢查。

1. 靜脈注射對比劑後，請在注射部位加壓 10~15 分鐘，確認無不良反應發生才可離開。
2. 檢查時有些人可能在注射對比劑後，會有噁心、嘔吐現象發生，請儘量多做深呼吸（由鼻子吸氣、嘴巴慢慢呼氣）。
3. 檢查後若無不適現象即可進食，如曾發生嘔吐現象，則應繼續觀察 30 分鐘後，如嘔吐現象未持續，方可進行正常飲食。
4. 門診患者可於檢查三日後，至本院掛號（可先電話或網路預約掛號）看診。

### 二、檢查的風險和機率：

1. 施打對比劑經常會引起全身發熱的感覺。
2. 少數人可能會產生輕微之過敏反應，比率約為百分之十，其症狀包括：噁心、嘔吐、頭暈、皮膚出疹或發癢等，但通常在短時間內就會消退。
3. 對具過敏體質者，可能會引起較嚴重的反應，如丘疹、蕁麻疹、寒顫、胸悶、呼吸困難等症狀。
4. 對具特異體質者，可能會發生罕見之喉嚨水腫、氣喘、血壓異常降低、心臟衰竭、休克及猝死（死亡機率約四萬至十萬分之一）。
5. 對比劑對腎臟具有毒性，尤其是腎功能不良者（如慢性糖尿病患者）發生腎衰竭的機率相對提高。
6. 少數人的血管壁本身可能具特異性或因經化療而改變，在施打對比劑時比較容易破裂，對比劑會因此注入血管周圍之組織中而產生疼痛，嚴重者會發生組織壞死。
7. 靜脈注射對比劑後，有時會發生靜脈炎或注射肢體腫脹、疼痛症狀。

### 三、檢查後可能出現的暫時或永久性症狀：

病患接受靜脈注射對比劑可能因對比劑滲漏而造成局部靜脈炎或肌肉壞死，若發生靜脈炎或注射肢體腫脹、疼痛症狀，請依下列方式處理：

1. 前 48 至 72 小時請在患處冰敷，每日約 3 至 4 次（每次約 15 分鐘），並抬高患側肢體。
2. 72 小時以後，請改用熱敷（溫度以略高於體溫即可），且抬高患側肢體。
3. 經上述處理後，腫脹、疼痛未見改善，請至本院就診。

### 四、注射對比劑後注意事項：

1. 檢查完成 24 小時內，如無特殊限制飲水，請多喝開水，以利對比劑排出。
2. 病患返家後，如有上述不良反應發生，上班時間可以電話 049-2990833 轉 3803 或 3800 聯絡，或返回放射線科，假日及非上班時間請直接至急診室就診。

### 五、其他可能的替代的方式：

1. 針對阻塞性尿路病變，也可由超音波檢查觀察阻塞情況，或可利用逆行性腎盂攝影、膀胱輸尿管內視鏡手術改善，唯風險可能較大。
2. 如需以其他的檢查來代替靜脈注射腎盂攝影(IVP)檢查，請與您的臨床醫師討論。

### 六、對比劑健保給付說明：

本院靜脈注射腎盂攝影(IVP)已全面採用非離子性對比劑，並由健保給付對比劑費用。

### 七、如果您對此次檢查或對比劑之使用有任何疑問，請於上班時間打電話向本科醫護人員詢問。

電話：049-2990833 轉 3800 (放射線科登記櫃檯)